


CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DEL BLOSSIDO DI AZOTO (NO₂) NEL LAZIO



Inquadramento del tema

La presenza del biossido di azoto in aria è legata ai processi di combustione ed all'attività fotochimica che ha luogo in atmosfera, cioè alla formazione dell'inquinante per effetto di reazioni chimiche tra sostanze prodotte direttamente dall'attività umana (ad esempio trasporti, impianti industriali e riscaldamento) e sostanze naturalmente presenti in atmosfera. L'attenzione della Comunità europea è volta alla diminuzione della concentrazione di questo inquinante a causa delle sue molteplici interazioni con l'ecosistema urbano e agricolo/forestale.

Il biossido di azoto è un gas irritante per le mucose e può contribuire all'insorgere di varie alterazioni delle funzioni polmonari: bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare. Prolungate esposizioni, anche a basse concentrazioni, provocano una drastica diminuzione delle difese polmonari con conseguente aumento di rischio di affezioni alle vie respiratorie. Il livello degli ossidi di azoto ricopre, poi, un ruolo importante nell'ambito dei processi di acidificazione delle aree naturali e agricole (danni alla vegetazione). L'acidificazione del suolo causa perdita di ioni calcio, magnesio, sodio e potassio e conduce alla liberazione di ioni metallici tossici per le piante. L'abbassamento del pH compromette, inoltre, anche molti processi microbici del terreno, fra cui l'azotofissazione. Gli ossidi di azoto contribuiscono al fenomeno delle piogge acide che determinano effetti negativi sulla conservazione dei monumenti e della vegetazione.

Definizione indicatore

La concentrazione di NO₂ è, assieme al numero di superamenti del valore limite orario, uno degli standard previsto per la caratterizzazione della qualità dell'aria dalla normativa europea ed italiana (d.lgs. n.155/2010). La normativa stabilisce come obiettivo il raggiungimento, entro il 2010, del livello di concentrazione media annua al di sotto di 40 µg/m³ sull'intero territorio.

L'*indicatore sintetico* scelto per rappresentare la situazione media regionale è la **concentrazione media annua**, ricavata mediando la concentrazione di NO₂ rilevata in tutte le stazioni della rete di qualità dell'aria dislocate nel territorio regionale, che rappresentano le differenti realtà territoriali presenti nel Lazio. L'indicatore utilizzato, essendo un valore medio, non può essere direttamente

confrontato con il target previsto dalla normativa, anche se è possibile utilizzare il target come indice di riferimento per una prima analisi dei dati.

Analisi


L'indicatore scende dal 1999 al 2014 ma rimane su concentrazioni pari a circa $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ non troppo distanti dal valore limite normativo per la concentrazione media annua. A fronte di una importante riduzione delle emissioni da sorgenti di combustione a livello nazionale residua dunque una concentrazione di NO_2 preoccupante; ciò è dovuto alla complessità dei meccanismi di formazione di NO_2 in atmosfera non proporzionalmente correlati alla riduzione delle emissioni.

L'andamento dell'indicatore negli anni è influenzato oltre che dall'entità delle emissioni e dalla situazione meteoroclimatica, dai cambiamenti della rete di monitoraggio: negli anni aumenta il numero totale di stazioni di misura e la composizione in stazioni urbane o rurali, da traffico o di fondo varia. Di seguito la composizione percentuale negli anni della rete in stazioni, dotate di analizzatore di PM_{10} , urbane da traffico (UT, che comprendono anche se suburbane da traffico e le industriali), urbane di fondo (UB) e rurali (RB che comprendono anche le suburbane di fondo).


| PERCENTUALI COMPOSIZIONE RETE | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------|------|-----------|------------------|------|------|
| PERIODO | TIPO DI STAZIONI | | | PERIODO | TIPO DI STAZIONI | | |
| | UT | UB | RB | | UT | UB | RB |
| 1999 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 2007-2010 | 55.9 | 32.4 | 11.8 |
| 2000 | 65.5 | 24.1 | 10.3 | 2011-2012 | 55.6 | 30.6 | 13.9 |
| 2001-2004 | 58.1 | 29.0 | 12.9 | 2013 | 59.0 | 28.2 | 12.8 |
| 2005-2006 | 60.6 | 27.3 | 12.1 | 2014 | 58.5 | 29.3 | 12.2 |

A livello regionale, nel 2014, circa il 17% delle stazioni della rete di rilevamento misurano un livello di concentrazione media annua superiore al valore limite ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$).


Il diverso stato delle realtà territoriali presenti a livello regionale è rappresentato dalla disaggregazione dell'indicatore su base provinciale tra gli anni 1999-2014 e dalla media di questo sugli anni 2009-2014 (il comune e la provincia di Roma sono state separate).




La situazione maggiormente critica si osserva nell'area urbana del comune di Roma, che è sempre sopra i $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mentre nelle altre province i livelli di concentrazione negli ultimi anni sono scesi a valori inferiori al valore limite.



In figura seguente è riportata, invece, la disaggregazione dell'indicatore nelle diverse tipologie di stazioni di misura, per tutto il periodo e mediato negli ultimi 5 anni in cui la composizione della rete è meno variabile. La concentrazione media di NO_2 rilevata nelle stazioni rappresentative delle aree urbane, da traffico e di background, nel territorio regionale risulta essere circa il triplo di quanto osservato nelle zone tipicamente rurali (lontane da sorgenti emmissive).





Le politiche attivate

Il biossido di azoto è un inquinante prevalentemente secondario, la cui presenza in aria è direttamente collegata alle emissioni di ossidi di azoto e alla presenza di composti organici volatili e ozono.

Il Piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio ricerca la riduzione generalizzata delle emissioni di inquinanti primari (NO_x) derivanti dai processi di combustione, tramite sia un'efficace politica di risparmio/efficienza energetica, sia l'introduzione di nuove tecnologie di combustione ad elevato rendimento e basse emissioni: veicoli di nuova generazione nel trasporto merci e privato, impianti di moderna tecnologia e interventi di promozione dei combustibili a basso impatto. Il problema dell'NO₂ a livello Europeo è generalizzato.

L'aumento del numero di veicoli circolanti, il ricambio del parco veicolare più lento del previsto e le maggiori emissioni dei veicoli rispetto ai limiti prescritti dagli standard di omologazione (Euro 3, 4 e 5) sono i principali motivi individuati dalla Commissione Europea che hanno portato al mancato rispetto degli obiettivi normativi. In particolare, le politiche comunitarie per i trasporti non hanno garantito le attese riduzioni delle emissioni inquinanti dai veicoli, soprattutto in riferimento agli NO₂. Studi sperimentali effettuati a livello europeo hanno evidenziato, infatti, che le emissioni medie dei veicoli Euro 3 (soprattutto NO_x), in condizioni reali di guida, non sono inferiori a quelle dei veicoli pre-Euro; analoghi risultati sono stati ottenuti per i veicoli Euro 4 e 5.

Media annua concentrazione NO₂ nel Lazio in µg/m³ nel 1999-2014 (Fonte: ARPA Lazio)

| ANNO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MEDIA | 49 | 49 | 47 | 47 | 46 | 46 | 49 | 50 | 46 | 41 | 43 | 39 | 42 | 37 | 35 | 29 |

NO₂: media annua per area e per tipologia di zona anni 1999-2013 (Fonte: ARPA Lazio)

| TIPO | UT | | | | | | UB | | | | | I | ST | SB | RB | | | | |
|------|----------------|-----------|------|--------|-------|---------|----------------|-----------|--------|---------|------|------|------|----------------|----------------|-----------|------|-------|---------|
| ANNO | COMUNE DI ROMA | FROSINONE | ROMA | LATINA | RIETI | VITERBO | COMUNE DI ROMA | FROSINONE | LATINA | VITERBO | ROMA | ROMA | ROMA | COMUNE DI ROMA | COMUNE DI ROMA | FROSINONE | ROMA | RIETI | VITERBO |
| 1999 | 77.7 | - | - | 45.0 | - | 40.0 | 54.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 77.9 | 53.8 | - | 46.0 | - | 39.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - |
| 2001 | 74.0 | 55.3 | - | 46.5 | - | 31.0 | 56.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - |
| 2002 | 75.7 | 55.5 | - | 47.5 | - | 30.0 | 56.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - |
| 2003 | 73.3 | 56.0 | - | - | - | 30.0 | 54.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | - | - | - |
| 2004 | 71.2 | 60.8 | - | 45.5 | - | 34.0 | 51.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | - | - | - |
| 2005 | 73.3 | 57.3 | - | 49.0 | - | 37.0 | 55.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | - | - | - |
| 2006 | 78.9 | 54.3 | - | 51.0 | 27.0 | 37.0 | 60.0 | 49.0 | - | - | 34.0 | 47.5 | - | - | - | 10.0 | - | - | - |
| 2007 | 69.2 | 54.3 | 66.5 | 47.0 | 29.0 | 37.0 | 56.7 | 48.0 | - | - | 31.0 | 42.5 | - | - | - | 10.0 | - | - | - |
| 2008 | 63.4 | 47.0 | 59.0 | 46.0 | 30.0 | 48.0 | 46.0 | 41.0 | 24.0 | 34.0 | 25.0 | 37.0 | - | - | - | 8.0 | - | - | - |
| 2009 | 65.8 | 44.3 | 65.5 | 53.0 | 30.0 | 34.0 | 50.3 | 43.0 | 28.0 | 43.0 | 26.0 | 43.5 | - | - | - | 8.0 | 10.0 | 10.0 | - |
| 2010 | 68.8 | 43.8 | 55.5 | 44.7 | 24.0 | 31.0 | 47.5 | 37.5 | 23.0 | 36.0 | 25.0 | 37.0 | - | - | - | 8.0 | 11.0 | 8.0 | - |
| 2011 | 74.3 | 44.6 | 63.0 | 45.3 | 26.0 | 36.0 | 52.3 | 42.5 | 23.0 | 39.0 | 30.0 | 41.5 | 37.0 | 41.5 | 19.0 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2012 | 67.8 | 40.8 | 52.5 | 40.3 | 26.0 | 34.0 | 45.3 | 40.0 | 21.0 | 37.0 | 27.0 | 33.5 | 33.0 | 35.0 | 16.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2013 | 64.3 | 36.6 | 25.9 | 39.0 | 24.0 | 28.0 | 43.8 | 35.0 | 23.0 | 26.0 | 25.0 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 23.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2014 | 60.8 | 34.6 | 21.6 | 29.3 | 21.0 | 29.0 | 37.7 | 33.0 | 22.5 | - | 22.0 | 26.0 | 26.0 | 22.5 | 14.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 |

METODOLOGIA

Per ogni anno il valore dell'indicatore è stato individuato secondo i seguenti passaggi:

1. calcolo del valore medio annuo di NO₂ per ogni stazione della rete regionale di qualità dell'aria;
2. media dei valori calcolati al punto 1.

Lo standard di riferimento è definito dall'Unione europea con la Direttiva 1999/30/CE recepito anche dalla normativa nazionale e si applica all'intero territorio regionale come valore obiettivo in vigore al 2010.

BASE STATISTICA

La base dati utilizzata è costituita dal valore orario della concentrazione di NO₂ registrato nelle centraline di monitoraggio della rete regionale di qualità dell'aria gestita dall'ARPA Lazio.

I dati vengono trasmessi dall'ARPA Lazio alla Regione Lazio che provvede a comunicarli all'Agenzia europea per l'ambiente secondo gli standard definiti in sede comunitaria. I dati hanno qualità e disponibilità eterogenee nello spazio e omogenee nel tempo.